

#!KORHNEV;
#!KORHCIMVAROS; #!KORHCIM;

#!AKTOSZTALYNEVE;
OEP KÓD: #!APOSZTKOD;

Intézetvezető főorvos: Dr. Lázár István Ph.D.

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Beteg neve: **#!NEV;**
Szül. hely, idő: **#!BSZULHELY; #!SZULIDO;**
Taj szám: **#!TAJ;**
Lakcím: **#!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;**

Alulírott kijelentem, hogy kezelőorvosom, dr LÁZÁR ISTVÁN a rajtam elvégzendő beavatkozás (máj daganat ellátó ereinek elzárása katéteres úton) mibenlétéről, esetleges szövődményeiről felvilágosított, és én ezek alapján abba beleegyezem. Minden ezzel kapcsolatos kérdésemre választ kaptam, további kérdésem nincs. A döntésre elegendő időt kaptam.

A fent nevezett beavatkozás (chemoembolisatio) arra szolgál, hogy az ismeretlen okú, növekvő daganat növekedését megállítsa, az esetleges daganat szóródási hajlamát csökkentse, illetve megszüntesse. Ennek érdekében a májat ellátó ereket selectiv módon katéterezik, festik, s amikor a katéter már csak daganathoz futó ágban van, akkor a katéterbe a daganatsejtek osztódását gátló gyógyszert, valamint olajos kontrasztanyagot adnak. Ezen anyag elakad a daganatkörnyéki erekben, nem engedi oda az oxigéndús friss vért. A benne elosztatott gyógyszer pedig ott marad a daganatban és csak hetek alatt szívódik föl. Ez a daganat részleges elhalásához vezet.

A beavatkozás egy műanyag katéteren keresztül zajlik, amelyet a combtő hajlatban ejtett nyíláson vezetnek be helyi érzéstelenítésben. A beavatkozás a máj állapotát, annak működését nem javítja, sőt kisebb mértékben ronthatja is. Ez az ára annak, hogy a daganat növekedését vissza tudjuk szorítani.

Tudomásom van róla, hogy ennek a beavatkozásnak szövődményei is lehetnek. Ezek között említhető a hasúri vérzés, hashártyagyulladás, az epehólyag gyulladása. A beavatkozás után láz, és 2-3 napig tartó erős májtáji fájdalom szinte bizonyosan előfordul, ennek tüneti kezelése a beküldő osztályon történik majd.

Miskolc, **#!AKTDATUMHONAPNEVVEL;**

.....
a beteg v. törvényes képviselő aláírása

.....
Dr. Lázár István (50005)