

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei**  
**Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház**

3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. E-mail: igazgato@bazmkorhaz.hu

**Erzsébet Hospice Otthon**  
Osztályvezető főorvos:

OEP KÓD: 0563A7306  
Tel.:(46) 515-200/11502

**BELEEGYZŐ NYILATKOZAT MELLKASCSPOLÁSBA**

Alulírott ..... (szül. idő.: .....)

tanúsítom, hogy engem Dr. Simkó Csaba kellő mértékben felvilágosított az alábbiakról:

- **A beavatkozást szükségessé tevő állapot:** A betegség következtében a mellüregben (a mellkas fala és a tüdő között) kóros mennyiségű folyadék szaporodott föl, mely összenyomja a tüdőt, ezáltal légzészavart (fulladást) okozhat.
- **A javasolt gyógymód** a mellüregben felgyűlt víz lebocsátása, mely remény szerint rövid időn belül a fulladás enyhülését eredményezi. (A fulladásnak más okai is lehetnek, melyeket a mellkascspolás nyilván nem befolyásol).
- **Az eljárás leírása:** ultrahang vizsgálattal megállapítják a mellüregben lévő kóros folyadék mennyiségét és elhelyezkedését, majd helyi érzéstelenítést követően, steril körülmények között egy műanyag csövet (branült) vezetnek be a mellüregbe, melyen keresztül lebocsátják azt.
- **A beavatkozás lehetséges szövődményei:** Bár a beavatkozás mindennaposnak számít, és az alkalmazott módszer alacsony kockázattal jár, a legnagyobb gondosság ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények.
  - a, A bordák alatt futó erek sérülése során felléphet vérzés, mely általában enyhe. Súlyosabb vérzéses szövődmények elkerülése érdekében fontos, hogy a mellkascspolás idején a beteg ne álljon véralvadást gátló („vérhígító”) gyógyszerek hatása alatt.
  - b, Előfordulhat a tüdő sérülése (légmell), mely akár műtéti beavatkozást is szükségessé tehet.
  - c, Ritka szövődményként előfordulhat a mellkasfal vagy a mellüreg befertőződése.
  - d, Nagy mennyiségű mellkasi folyadék lebocsátásakor átmeneti kínzó köhögés, sőt tüdőviznyő is felléphet.
  - e, A beavatkozás általában minimális fájdalommal jár.
- **Más szóba jövő kezelési eljárás:** A felgyűlt mellüregi folyadék az esetek egy részében vízajtók adásával is csökkenthető. Ez lényegesen lassabb, kevésbé hatékony, időnként a szervezet só-, és folyadékháztartásának felborulásával, a veseműködés romlásával, csökkenő vérnyomással, gyengeséggel járhat.

A hascsapolás lényegéről és esetleges szövődményeiről számomra érthető tájékoztatást, felmerülő kérdéseimre kielégítő választ kaptam, és kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon (minden kényszerből mentesen) dönthessek arról, milyen kezelést szeretnék igénybe venni.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

**A mellkascsapolásba beleegyezem.**

Miskolc, .....

.....  
a beavatkozást végző orvos aláírása

.....  
beteg olvasható aláírása

.....  
vagy a törvényes képviselő aláírása (1)

Beteg neve:  
Születési ideje:  
Születési helye:  
Lakcíme:

Törv. képvis. neve:  
Születési ideje:  
Születési helye:  
Lakcíme:

**(1)** Korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozatot a törvényes képviselő (hozzátartozó) adja. Korlátozottan cselekvőképes beteg esetén javasolható a beteg önálló nyilatkozattétele is, ez azonban a törvényes képviselő (hozzátartozó) nyilatkozatát nem pótolja.