

Figyelmeztetőlap koponyasérültek számára

Ön, illetve hozzátartozója olyan koponyasérülést szenvedett, mely szakrendelésen történt vizsgálatok alapján könnyű vagy alacsony kockázatú sérülésnek tekinthető, ezért osztályos felvétele nem szükséges.

Tekintettel arra, hogy – igen ritkán– a látszólag enyhe, kezdetben teljesen tünetmentes sérülések is járhatnak késői komplikációkkal – elsősorban lassan növekvő vérömleny kialakulásával –, kérjük, hogy szíveskedjen figyelmesen elolvasni és betartani az alábbi tanácsokat!

Az alábbi tünetek jelentkezése esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni, az ambulanciát (ismét) haladéktalanul fel kell keresni:

- Aluszékonyság fellépése (nem, vagy nehezen ébreszthető fel, magára hagyva könnyen elalszik)
- Megváltozott viselkedés
- Fokozódó fejfájás
- Beszédzavar
- Karban vagy lábban észlelt gyengeség és/vagy érzészavar kialakulása
- Ismétlődő hányás
- Pupillák (szembogár) tágulása
- Pupilla (szembogár) fényre nem szűkül
- Epilepsziás vagy más görcsös rángások fellépése
- A sérülés helyén gyorsan növekvő, egyre nagyobbodó dudor kialakulása
- Fülből, orrból vízszerű, véres vagy szalmasárga váladék csorgása

Javasoljuk, hogy 24 órán keresztül ne vegyen be fájdalmak csillapítására Panadolnál vagy Rubophennél (paracetamolnál) erősebb fájdalomcsillapítót.

Nem ajánlott pl.:acetilszalicilsav, diclofenac vagy ibuprofen tartalmú és csak vényre kapható fájdalomcsillapító.