

Beteg neve: #!NEV; TAJ szám: #!TAJ;
#!KORHNEV; #!KORHCIM;

Naplószám vagy Törzsszám: #!VKER_FekvKero_Torzsszam;#!VKER_AmbKero_KotetNaplo;

Lumbális Sztteroid Injekció

Tájékoztató - adatlap

Tisztelt #!NEV;!

Önnek ágyéki ízületi/gyöki blokádot tervezünk végezni. A beavatkozás műtői környezetben történik röntgen képerősítő ellenőrzés mellett. A szúrás ideje alatt Ön hason fekvő helyzetben lesz. A bőr megfelelő fertőtlenítéses lemosása után, steril körülmények között röntgen képerősítő valós idejű ellenőrzése mellett kerül bevezetésre a tű a célzott helyre. A tű megfelelő pozíciója után minimális (1 ml) kontrasztanyag befecskendezésével igazoljuk a megfelelő pozíciót. Ha ez megfelelő, akkor történik a az érzéstelenítő (Bucain) és sztteroid fájdalomcsillapító - gyulladáscsökkentő (Depo Medrol vagy Kenalog vagy Diprophos) keverék befecskendezése. Ilyenkor kis feszítő érzést érezhet. Az egész beavatkozás során, mivel éber állapotban történik, bármilyen gond, probléma adódna, kérjük, jelezze beavatkozást végző orvosnak, de a hirtelen elmozdulás nem javasolt. A beavatkozás végeztével az osztályra visszaillesztik. Egy körülbelül két órás megfigyelési időt követően távozhatsz.

A beavatkozás hatékonyságának ellenőrzése céljából kérjük, hogy az alábbi két skálán jelölje meg a beavatkozás előtti fájdalom szintet, illetve a beavatkozás után egy órával érzett fájdalom szintet.

Szúrás előtt:

Nincs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elviselhetetlen
fájdalom fájdalom

Szúrás után:

Nincs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elviselhetetlen
fájdalom fájdalom

Beadott injekció:	Depo Medrol /Kenalog/Diporphos ... amp.	Bucain ml.			
Szúrás:	jobb oldal	bal oldal	két oldal		
Szúrás szintje:	L.I.	L.II.	L.III.	L.IV.	L.V.
Szúrás Típusa:	TFESI	Lysis bloká	Bertolotti	Facet bloká	

Végezte:

Dr. #!OSZTVZSGKEZORVPROP(1);
#!OSZTVZSGKEZORVPROP(2);

.....
aláírás, pecsét